| SUPPLEMENTARY TABLE 1: Univariate analysis for OS. | | | |
|---|---|---|---|
| | | Univariate | |
| Variable | | HR (95% CI) | p |
| Age | <55 | 1 | |
| | ≥ 55 | 1.20 (0.50-2.89) | 0.677 |
| Gender | Female | 1 | |
| | Male | 1.50 (0.70-3.21) | 0.298 |
| ECOG-PS | 0 | 1 | |
| | 1 | 1.22 (0.57-2.62) | 0.606 |
| Primary location | Major salivary gland | 1 | |
| | Other | 1.52 (0.67-3.51) | 0.317 |
| T stage | T1-2 | 1 | |
| | T3-4 | 1.54 (0.68-3.49) | 0.301 |
| Nodal status | N - | 1 | |
| | N + | 1.50 (0.56-4.06) | 0.421 |
| Surgical margin | Negative | 1 | |
| | Positive | 0.99 (0.42-2.31) | 0.981 |
| Solid component | No | 1 | |
| | Yes | 2.44 (0.84-7.07) | 0.101 |
| PNI | No | 1 | |
| | Yes | 3.78 (0.49-28.68) | 0.198 |
| Adjuvant treatment | No | 1 | |
| | Yes | 2.37 (0.56-10.04) | 0.241 |
| Type of adjuvant treatment | RT | 1 | |
| | CRT | 1.24 (0.49-3.16) | 0.652 |

CI: Confidence interval; CRT: Chemoradiotherapy; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; HR: Hazard ratio; PNI: Perineural invasion; PS: Performance status; RT: Radiotherapy